УДК 636.5.033:636.085.8:636.085.57

Ефективність застосування підкислювачів у промисловому вирощуванні курчат–бройлерів

О.В. Демчишин
sdv25061991@gmail.com

Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН,
вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, 46027, Україна

Як альтернативу кормовим антибіотикам для збереження поголів'я птиці та підвищення продуктивності все частіше застосовують підкислювачі на основі органічних та неорганічних кислот. У статті наведено результати вивчення ефективності застосування підкислювача Фідацид Макс Л (рідкий) PANCOSMA S.A. (Швейцарія) для вирощування курчат–бройлерів.

Дослідження проводили на двох групах курчат–бройлерів породи Ross 308. Курчатам дослідної групи крім повноцінного комбікорму випоювали підкислювач Фідацид Макс Л з розрахунку 1 л на 1 тону води. Випоювання проводили з 27 дня відгодівлі протягом 10 днів (27 – 31 і 34 – 38 дні).

Встановлено, що випоювання підкислювача Фідацид Макс Л з 27 дня вирощування курчат сприяло підвищенню збереженості поголів'я на 4,6%. Загальний падіж курчат зменшувався у 2 рази ($P \leq 0,001$) і становив 4,3%, при допустимій нормі до 5%. Виявлено, що застосування підкислювача сприяло економії кормів при більш високих продуктивних показниках. Спостерігали зменшення затрат корму на 1 голову на 8,7% ($P \leq 0,01$) і зменшення конверсії корму у дослідній групі на 0,19 од., що є свідченням кращої перетравності корму та його засвоюваності організмом курчат. Курчата–бройлери дослідної групи на 43 день вирощування мали більшу живу вагу на 47 г і вагу тушки на 30 г, тобто, на 1,8% та 1,6% ($P \leq 0,01$) відповідно. Європейський індекс ефективності у дослідній групі на 56,5 одиниць був більшим, ніж у контрольній групі курчат.

Ключові слова: підкислювачі, курчата–бройлери, відгодівля.

Эффективность применения подкислителей в промышленном выращивании цыплят–бройлеров

О.В. Демчишин
sdv25061991@gmail.com

Тернопольская исследовательская станция Института ветеринарной медицины НААН,
ул. Тролейбусная, 12, г. Тернополь, 46027, Украина

В качестве альтернативы кормовым антибиотикам для сохранения поголовья птицы и повышение производительности все чаще применяют подкислители на основе органических и неорганических кислот. В статье приведены результаты изучения эффективности применения подкислителя Фидацид Макс Л (жидкий) PANCOSMA S.A. (Швейцария) для выращивания цыплят–бройлеров.

Исследования проводились на двух группах цыплят–бройлеров породы Ross 308. Цыплятам исследовательской группы кроме полноценного комбикорма выпаивали подкислитель Фидацид Макс Л из расчета 1 л на 1 тонну воды. Выпойки проводили с 27 дня откорма в течение 10 дней (27 – 31 и 34 – 38 дня).

Установлено, что выпойка подкислителя Фидацид Макс Л с 27 дня выращивания цыплят способствовало повышению сохранности поголовья на 4,6%. Общий падеж цыплят уменьшался в 2 раза ($P \leq 0,001$) и составил 4,3%, при допустимой норме до 5%. Виявлено, что применение подкислителя способствовало экономии кормов при более высоких производительных показателях. Наблюдали уменьшение затрат корма на 1 голову на 8,7% ($P \leq 0,01$) и уменьшение конверсии корма в

Citation:

Demchuschun, S.V. (2016). The effectiveness of the use of acidifiers in the industrial growing of broiler chickens. *Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj*, 18, 2(67), 81–84.

Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhytskyj, 2016, vol. 18, no 2 (67)

опытной группе на 0,19 ед., что свидетельствует о лучшей переваримости корма и его усвояемости организмом цыплят. Цыплята-бройлеры опытной группы на 43 день выращивания имели большую живую массу на 47 г и вес тушки на 30 г, то есть на 1,8% и 1,6% ($P \leq 0,01$) соответственно. Европейский индекс эффективности в исследовательской группе на 56,5 единиц был больше, чем в контрольной группе цыплят.

Ключевые слова: подкислители, цыплята-бройлеры, откорм.

The effectiveness of the use of acidifiers in the industrial growing of broiler chickens

S.V. Demchuschun
sdv25061991@gmail.com

*Ternopil Experimental Station of the Institute of Veterinary Medicine NAAS,
Trolleybusna Str., 12, Ternopil, 46027, Ukraine*

As an alternative to feed antibiotics for saving poultry livestock and increasing productivity the acidifiers based on organic and inorganic acids are used more and more frequently. The article represents the results of study of effectiveness of Fidacid acidifier usage for breeding broiler chickens.

The study has been conducted on two groups of broiler chickens of Ross 308 breed. The chickens of the experimental group except the full feed-stuff have been given the acidifier at a rate of 1 liter per 1 ton of water. The watering has been carried out from the 27th day of feeding for 10 days (27 – 31 and 34 – 38 days).

It has been established that the acidifier watering from the 27th day of breeding chickens has contributed to the increase of preservation of livestock in 4.6%. The overall mortality of chickens has decreased in 2 times ($P \leq 0,001$) and amounted to 4.3%, with the permissible limit up to 5%. It has been found that the application of the acidifier has promoted the economy of feed at higher productive indices. There has been a decrease in cost of feed per 1 head in 8.7% ($P \leq 0,01$) and a decrease in feed conversion in the experimental group in 0.19 units. This is the evidence of better digestibility of feed and its taking by the bodies of chickens. The

live weight of broiler chickens of the experimental group on the 43rd day of breeding increased in 47 grams and carcass weight increased in 30 grams, that is in 1.8% and 1.6% ($P \leq 0,01$), respectively. The European index of efficiency in the experimental group has been 56.5 units higher than in the control group of chickens.

Keywords: acidifiers, chickens, broilers, fattening.

Вступ

Птахівництво посідає одне з головних місць у виробництві м'яса. В останні роки в Україні спостерігається стабільний розвиток промислового вирощування бройлерів, адже – це один із найперспективніших видів агробізнесу.

Курчата-бройлери мають високий генетичний потенціал росту, що вимагає надзвичайно ретельного балансування повнораціонних комбікормів за енергією і всіма необхідними елементами живлення та біологічно активними речовинами. Традиційна технологія виробництва продукції птахівництва включає використання кормових антибіотиків з метою підвищення продуктивності та збереження птиці. З 2000 року в Європейському Союзі заборонено використання кормових антибіотиків у птахівництві. Тому, для виробництва екологічно чистої продукції птахівництва в останні роки ведеться пошук нових речовин природного походження з мінімальним негативним впливом на організм птиці. Як альтернативу антибіотикам все частіше застосовують пробіотики, пребіотики, синбіотики, фітобіотики, натуральні стимулятори росту, імуностимулятори, специфічні ферменти, підкислювачі та ін.. речовини. Підкислювачі – це препарати, які у своєму складі містять органічні і неорганічні кислоти та інші речовини. З кислот найчастіше використовують оцтову, аскорбінову, янтарну, масляну, мурашину, молочну, яблучну, пропіонову, бензойну, лимону, фумарову, лауринову та їх солі (Carenko, 2002; Okolelova et al., 2010; Kuz'menko et al., 2011; Syvachenko and Djachenko, 2016).

Органічні кислоти сприяють розвитку мікрофлори кишечника курчати після виведення і в такий спосіб поліпшують стан шлунково-кишкового тракту, пригнічують ріст і розвиток патогенної мікрофлори (*Salmonella*, *E. coli* та ін.), збудників плісняви в кормах і кормовій сировині. У шлунково-кишковому тракті птиці вони сприяють оптимізації процесів травлення, пригнічуючи гнильні процеси й активізуючи роботу ферментів. рН і мікробне навантаження в шлунково-кишковому тракті птиці зменшуються, покращується засвоєння поживних речовин, поліпшується приріст ваги та зменшуються випадки розладів травної системи. Це в кінцевому результаті призводить до підвищення загальної резистентності організму курчат, збільшує швидкість росту та збереженість птиці (Kuznecova, 2007; Jegorov and Makaryns'ka, 2010; Syvachenko and Djachenko, 2016).

Метою роботи було вивчити ефективність застосування підкислювача Фідацид Макс Л для вирощування курчат-бройлерів.

Матеріал та методи досліджень

Експериментальні дослідження проводили у фермерському господарстві «Подільська марка» с. Мушкutenці Дунаєвського району Хмельницької області.

Дослідження проводили на двох групах курчат-бройлерів породи Ross 308. Годівлю курчат у першій (контрольній) групі проводили збалансованим повнораціонним комбікормом відповідно до норм згідно з віковими періодами вирощування. Протягом періоду вирощування застосовували премікси Предстартер, Стартер, Гроуер та Фінішер. Курчатам другої (дослід-

ної) групи крім повноцінного комбікорму випоювали підкислювач Фідацид Макс Л (рідкий) PANCOSMA S.A. (Швейцарія) з розрахунку 1 л на 1 тону води. Випоювання проводили з 27 дня відгодівлі протягом 10 днів (27 – 31 і 34 – 38 дні) після проведення усіх профілактичних заходів та щеплень курчат. Середній день вирощування тривав 43 доби. Щільність посадки курчат становила 16,4 голів на 1 м² площі. Утримання курчат підлогове на незмінній підстилці.

У період дослідів проводили облік збереженості поголів'я, маси курчат-бройлерів, споживання корму та води, розраховували витрати корму на 1 кг приросту живої маси. Для комплексної оцінки ефективності вирощування розраховували Європейський індекс продуктивності (EEF) (Kavtarashvyly and Golubov, 2013). Нормативне значення EEF вважається 280 – 300, більше 300 – дуже добрий показник, менше 250 одиниць – низький.

Отримані результати досліджень обробляли статистично з використанням програм Microsoft Excel і Statistika 99 Edition. Різницю вважали вірогідною при $P \leq 0,05$; $P \leq 0,01$ та $P \leq 0,001$.

Результати та їх обговорення

Результати досліджень ефективності використання підкислювача Фідацид Макс Л на збереженість поголів'я курчат-бройлерів наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Вплив випоювання підкислювача Фідацид Макс Л на збереженість курчат бройлерів, n = 2

Показники	Групи курчат	
	I (контрольна)	II (дослідна)
Загальна кількість курчат, гол.	24 992	26 520
Загальний падіж, гол.	2 234	1 136*
Відправлено курчат до забою, гол.	22 758	25 384
Відсоток загального падежу, %	8,9	4,3*
Збереженість поголів'я, %	91,1	95,7

Примітка: * – $P \leq 0,001$ – щодо контрольної групи

З табл. 1 видно, що випоювання підкислювача Фідацид Макс Л з 27 дня вирощування курчат сприяло підвищенню збереженості поголів'я на 4,6%. Загальний падіж курчат зменшувався у 2 рази ($P \leq 0,001$) і становив 4,3%, при допустимій нормі до 5%. Це є свідченням зниження рівня розвитку патогенної мікрофлори, виникнення захворювань та загибелі курчат.

Результати вирощування курчат-бройлерів за випоювання підкислювача Фідацид Макс Л наведено в табл. 2.

З табл. 2 видно, що застосування підкислювача Фідацид Макс Л сприяло економії кормів при більш високих продуктивних показниках. Так, спостерігали зменшення затрат корму на 1 голову на 8,7% ($P \leq 0,01$) і зменшення конверсії корму у дослідній групі на 0,19 од. Це свідчить про кращу перетравність корму та його засвоюваність організмом курчат. Як результат курчат-бройлери дослідної групи на 43 день вирощування мали більшу живу вагу на 47 г і вагу тушки на 30 г, тобто, на 1,8% та 1,6% ($P \leq 0,05$) відповідно.

Найбільш об'єктивним показником економічної оцінки вирощування курчат бройлерів є Європейський індекс ефективності, який у дослідній групі на 56,5 одиниць є більшим, ніж у контрольній групі.

Орієнтовне обрахування показало, що застосування підкислювача Фідацид Макс Л є економічно ефективним за вирощування курчат-бройлерів. Розрахунок проводили орієнтуючись на посадку 25 тис. курчат. Вартість 1 кг тушки курчати становить 36 грн. Падіж у контрольній групі був на 4,3% більший, отже, одержано менше курчат на 1 075 голів ($1075 \times 1,819 \times 36 = 70395,3$ грн.). Випоювання підкислювача дозволяє одержати тушку бройлера вагою на 30 г більше, відповідно, господарство при збереженості поголів'я 95,7% одержить більше на 25 839 грн. ($23925 \times 0,03 \times 36 = 25839$).

Вартість 1 л засобу Фідацид Макс Л становить 90 грн. Протягом періоду випоювання підкислювача курчатами було спожито 84,1 тону води, і відповідно затрачено 7560 грн. ($84 \times 90 = 7560$). При посадці у 25 тис. курчат-бройлерів у контрольній групі буде використано кормів на 4,5 тони більше, що приведе ще до збитків у 13,5 тис. грн.

Таблиця 2

Вирощування курчат бройлерів за випоювання підкислювача Фідацид Макс Л, n = 2

Показники	Групи курчат	
	I (контрольна)	II (дослідна)
Загальна кількість курчат, гол.	24 992	26 520
Середня вага при посадці, г	39,0	32,8
Відправлено птиці до забою, гол.	22 758	25 384
Загальна жива вага курчат, кг	59 063	67 064
Загальний тоннаж м'яса, кг	41 403	46 944
Жива маса одного бройлера, кг	2,595	2,642*
Середня вага битої тушки бройлера, кг	1,819	1,849*
Середній вихід тушки, %	70,1	70,0
Кількість спожитого корму, кг	110 000	112 000
Розхід корму на 1 голову, кг	4,833	4,412**
Середньодобовий приріст, г	60,348	61,441*
Конверсія корму	1,86	1,67*
Європейський індекс ефективності, од.	295,6	352,1

Примітка: * – $P \leq 0,05$; ** – $P \leq 0,01$ – щодо контрольної групи

Таким чином, господарство з одного пташника протягом 43 днів при вирощуванні курчат-бройлерів зазнає збитків у 88,660 тис. грн. ($70395,3 + 25839 - 7560 - 13,5 = 88660,8$). Враховуючи ці втрати протягом року і для декількох пташників – це значні економічні збитки.

Отже, з метою виготовлення якісної та безпечної тваринницької продукції, яка відповідає державним стандартам України, вимогам СОТ та ЄС, в першу чергу необхідно підтримувати у нормальному фізіологічному стані екосистему шлунково-кишкового тракту курчат-бройлерів. При цьому слід застосовувати природні біологічні препарати та речовини, які знижують захворювання курчат та підвищують ріст та продуктивність птиці. На ринку України переважають закордонні препарати підкислювачі (регулятори кис-

лотності) виробництва країн Бельгії, Німеччини, Австрії, Швейцарії і Голландії. Тому, розробка нових вітчизняних високоефективних препаратів підкислювачів на основі органічних і неорганічних кислот є актуальним та перспективним.

Висновки

Введення до раціону курчат-бройлерів підкислювача Фідацид Макс Л сприяє підвищенню збереженості поголів'я на 4,6%, Європейського індексу ефективності – на 56,5 од. та зменшенню затрат корму на 1 голову на 8,7% і конверсії корму у дослідній групі на 0,19 од.

Перспектива подальших досліджень. Розробка нових вітчизняних підкислювачів для вирощування курчат-бройлерів.

Бібліографічні посилання

- Carenko, O.M. (2002). *Ekonomichni osnovy vykorystannja resursozberigajuchyh, ekologichno chystyh i bezvidhodnyh tehnologij u tvarynnyctvi i ptahivnyctvi* [The economic fundamentals of resource use, environmentally friendly technologies and waste in livestock and poultry]. Sumy: JSC «SOD», publishing house «Cossack shaft» (in Ukrainian).
- Okolelova, T.M., Kuznjecov, A.S., Savchenko, V.S. (2010). *Preparat Formy v kombykormah dlja brojlerov* [The product Formy a kombykormah for broylerov]. *Efektivne ptahivnyctvo – Effective poultry*. 4, 37–39 (in Ukrainian).
- Syvachenko, Je.V., Djachenko, L.S. (2016). *Produktyvnist' ta zabijni jakosti kurchat brojleriv za zgodovuvannja riznyh doz pidkysljuvacha ta antybiotyku* [Performance and slaughter quality of broiler chickens by feeding different doses and antibiotics Acidifiers]. *Naukovo-tehnichnyj bjuleten' NDC biobezpeky ta ekologichnogo kontrolju resursiv APK – Scientific and technical bulletin SIC biosafety and environmental control resources AIC*. 4, 1, 244–250 (in Ukrainian).
- Kuz'menko, L.M., Vyslan'ko, O.O., Ban'kovs'ka, I.B. (2011). *Efektivnist' vykorystannja novogo preparatu – pidkysljuvacha kormiv iz vmistom helatnyh spoluk mikroelementiv – u godivli molodnjaku svynej* [The efficiency of a new drug – Acidifiers of feed containing chelated micronutrient compounds – in feeding young pigs]. *Visnyk Poltavs'koi' derzhavnoi' agrarnoi' akademii' – Journal of Poltava State Agrarian Academy*. 4, 81–85 (in Ukrainian).
- Jegorov, B.V., Makaryns'ka, A.V. (2010). *Suchasni al'ternatyvy kormovym antybiotykom* [Modern alternative to feed antibiotics]. *Zernovi produkty i kombikormy – Cereal products and feed*. 3, 27 – 34 (in Ukrainian).
- Kuznecova, T. (2007). *Probyotyky y podkyslytely v kormleny nesushek* [Probiotics and podkyslytely in feeding nesushek]. *Kombykorma – Kombykorma*. 7, 73 (in Russian).
- Kavtarashvyly, A.Y., Golubov, Ja.Y. (2013). *Opredelenye effektivnosti proyzvodstva ptycevodcheskoj produkcyi ekspress-metodamy* [Determination of the effectiveness of production ptytsevodcheskoy products Express-method]. *Suchasne ptahivnyctvo – Modern poultry*. 2, 6–9 (in Ukrainian).

Стаття надійшла до редакції 30.09.201