УДК 636.39.053.087.7:614.9:612.017

Неспецифічна резистентність козенят за дії пробіотики «Евіталія» в умовах не регульованого мікроклімату

А.М. Петренко, Л.Л. Куш
Petrenko@e-mail.ua

Харківська державна зооветеринарна академія,
смт. Мала Данилівка, Дергачівський район, Харківська область, 62341, Україна

Мета роботи – дослідження полягали в виявленні впливу пробіотичної закваски «Евіталія» на неспецифічну резистентність козенят заанівської породи в умовах мікроклімату згідно ВНТП (для вівчарських та козівничих підприємств. Отримані результати та їх новизна: вперше випробувана нова пробіотична закваска «Евіталія», при пероральному введенні її козенятам в дозі 200 мл/голову – вранці та ввечері по 100 мл. Встановлено, що застосування «Евіталія» сприяє активізації окислювально-відновних процесів в організмі козенят, стимуляції еритропоєзу: підвищення концентрації гемоглобіну на 0,56% ($P \leq 0,05$), кількість еритроцитів – 10,2% ($P \leq 0,05$).

Використання препарату помірно активізує процеси метаболізму в організмі козенят: підвищує вміст загального білку на 7,14% ($P \leq 0,05$), глобулінів – на 1,76% ($P \leq 0,05$). Застосування препарату «Евіталія» у вказаних дозах сприяє стимуляції природної резистентності організму козенят: гуморальні показники захисту (БАСК) зросли на 1,52%, (ЛАСК) на – 1,81%, клітинні показники (ФА) в порівнянні з контролем були вище на – 4,97%.

Ключові слова: пробіотик «Евіталія», козенята, заанівська порода, природна резистентність, морфологічні показники крові, еритроцити, лейкоцити загальний білок, альбуміни, глобуліни, фагоцитарна активність нейтрофілів, бактерицидна та лізоцимна активність сироватки крові.

Неспецифическая резистентность козлят за действия пробиотика «Эвиталия» в условиях не регулируемого микроклимата

А.Н. Петренко, Л.Л. Куш
Petrenko@e-mail.ua

Харьковская государственная зооветеринарная академия,
пгт. Малая Даниловка, Дергачевский район, Харьковская область, 62341, Украина

Цель исследования заключалась в выяснении влияния пробиотической закваски «Эвиталия» на неспецифическую резистентность козлят зааневской породы в условиях микроклимата согласно ВНТП (для овцеводческих и козоводческих предприятий): температура воздуха в помещении 12 – 14 °С, относительная влажность 55 – 70%, вміст діоксиду вуглецю – 1,5 – 1,8 л/м³, аміаку – 10 – 15 мг/м³, обміненія повітря мікроорганізмами 15 – 20 тис. КУО/м³. Методы исследования: гигиенические, гематологические, биохимические, иммунологические, статистические. Получение результатов и их новизна: впервые испытана новая пробиотическая закваска «Эвиталия», при пероральном введении ее козлятам в дозе 200 мл/голову – утром и вечером по 100 мл. Установлено, что применение «Эвиталия» способствует активизации окислительно-восстановительных процессов в организме козлят, стимуляции эритропоэза: повышение концентрации гемоглобина на 0,56% ($P \leq 0,05$), количество эритроцитов – 10,2% ($P \leq 0,05$).

Применение препарата умеренно активизирует процессы метаболизма в организме козлят: повышает содержание общего белка на 7,14% ($P \leq 0,05$), глобулинов – на 1,76% ($P \leq 0,05$). Применение препарата «Эвиталия» в указанных дозах способствует стимуляции естественной резистентности организма козлят: гуморальные показатели защиты (БАСК) увеличились на 1,52%, (ЛАСК) на 1,81%, клеточные показатели (ФА) в сравнении с контролем были выше на – 4,97%.

Citation:

Petrenko, A.N., Kushch, L.L. (2016). Nespetsifichna kids resistance under probiotics «Evitaliya» under no adjustable microclimate. *Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z. Gzhyskyj*, 18, 3(70), 196–199.

Ключевые слова: пробиотик «Эвitalia», козлята, зааневской порода, естественная резистентность, морфологические показатели крови, эритроциты, лейкоциты, общий белок, альбумины, глобулины, фагоцитарная активность нейтрофилов, бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови.

Nespetsifichna kids resistance under probiotics «Evitaliya» under no adjustable microclimate

A.N. Petrenko, L.L. Kushch
Petrenko@e-mail.ua

Kharkiv state academy veterinarian,
village Small Danilovka, Dergachi district, Kharkiv region, 62341, Ukraine

Probiotic «Evitaliya» is freeze-dried, specific strains of lactic acid microorganisms (*Lactococcus lactis*, *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus helveticus*, *Propionibacterium fredenreichii* ssp *shernanii*), they contain vitamins B1, B2, B6, B12, A, E, C iron minerals, calcium, magnesium.

The purpose of the study was to clarify the effect of the probiotic ferment «Evitaliya» on nonspecific resistance of kids zaanovskoy breed microclimate conditions according VNTP (for sheep and goat breeding enterprises): the room temperature 12–14 °C, relative humidity of 55–70%, the carbon dioxide content – 1.5–1.8 l/m³ and ammonia – 10–15 mg/m³ air bacterial contamination 15–20 tys. KOE/m³. Implementation of this goal was decided to use hygienic (temperature, relative humidity, air velocity); hematological (red blood cells, white blood cells, hemoglobin), biochemical (total protein, albumin, globulin); immune (humoral factors – lysozyme and bactericidal activity of blood serum, cell – the neutrophil phagocytic activity), statistics

Getting results and their novelty: for the first time tested the new probiotic yeast «Evitaliya», with its goats orally at a dose of – 200 ml/head in the morning and evening, 100 ml.

It was found that the use of «Evitaliya» promotes activation of redox processes in the body kids, stimulation of erythropoiesis: increase in hemoglobin concentration of 0.56% ($P \leq 0.05$), the number of red blood cells to – 10.2% ($P \leq 0.05$).

Use of the drug is moderately activates metabolic processes in the body of kids: increases total protein content by 7.14% ($P \leq 0.05$), globulin – by 1.76% ($P \leq 0.05$). Use of the drug «Evitaliya» at the indicated doses helps stimulate natural resistance organism kids: humoral protection indicators (BASK) rose by 1.52% (LASK) by 1.81%, the cell indices (FA) compared to the control were higher – 4.97%.

Key words: probiotic «Evitaliya» goats, zaanovskoy breed, natural resistance, morphological parameters of blood, red blood cells, white blood cells, total protein, albumin, globulin, phagocytic activity of neutrophils, bactericidal and lysozyme activity of blood serum.

Вступ

В сучасних умовах перевага надається таким (БАР), які не здатні накопичуватись в організмі, не забруднюють оточуюче середовище при виведенні з нього, а самі метаболізуються, здійснюючи позитивний вплив на формування біологічної продукції.

Науковцями встановлені різноманітні зв'язки продуктивності сільськогосподарських тварин з енергетичними процесами в органах і тканинах. Обмін речовин та енергії є найбільш суттєвим ланцюгом в життєдіяльності організму, особливо при дії на нього кормових факторів, мікроклімату приміщень, зовнішнього середовища та технологічних прийомів ведення галузі (Trubnikov, 2007). Для зменшення негативного впливу цих факторів на організм тварин у ветеринарній медицині на сучасному етапі значна увага приділяється пошукам і застосуванню натуральних біологічно активних речовин, які стимулюють ріст і розвиток тварин, підвищують резистентність організму, їх стійкість до захворювань та збереженість поголів'я, зменшують витрати корму на одиницю продукції.

На сучасному етапі ведення тваринництва вчені значну увагу приділяють контролю над рівнем природної резистентності організму. Відомо, що рівень резистентності організму змінюється залежно від багатьох факторів, зокрема від віку тварин, пори року, годівлі, умов утримання, впливу на організм хімічних, фізичних, біологічних та інших чинників (Bokun et al.,

2002; Derevjanko et al., 2004). Питанням резистентності, або імунітету в сучасній біології донедавна не приділяли належної уваги в наукових дослідженнях, а, особливо, в практичній діяльності спеціалістів тваринницької галузі (Kosenko et al., 2004; Panin et al., 2012; Trubnikov, 2007; Chornyj et al., 2016).

Головною особливістю закваски «Евіталія» є здатність мікроорганізмів збразжувати вуглеводи без утворення газів, але з утворенням кислот, які закислюють вміст кишечника і тим самим пригнічують ріст гнильних та умовно-патогенних мікробів, знижують навантаження на печінку за рахунок зменшення утворення амінів, енерготоксинів та інших речовин мікробного походження, що мають благотворну дію на підвищення загальної резистентності.

Матеріал і методи досліджень

Для дослідження були відібрані козенята заанівської породи. Тварини, за принципом аналогів, були розподілені на контрольну та дослідну групи, по 10 голів у кожній: контрольна група одержувала повнораціонне годування, дослідній – крім загального раціону задавали перорально двічі на добу в дозі 200 мл/голову вранці та ввечері – по 100 мл закваски «Евіталія» за прийом.

Закваска «Евіталія» представляє собою ліофільно висушені, але здатні розмножуватися в травному тракті, спеціальні штами молочнокислих та інших мік-

поорганізмів (*Lactococcus lactis*, *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus helveticus*, *Propionibacterium fredenreichii* ssp. *shermanii*) та вітаміни: B₁, B₂, B₆, B₁₂, A, E, C, фолієву кислоту, мікроелементи заліза, кальцію, магнію та ін.

Рівень резистентності організму козенят оцінювали за морфологічним складом та вмістом загального білку і білкових фракцій в сироватці крові. Кров для досліджень у козенят брали до годування з яремної вени. У крові визначали: концентрацію гемоглобіна по Салі; кількість лейкоцитів і еритроцитів – в камері з сіткою Горяєва; загальний білок сироватки крові і його фракції – рефрактометричним методом; показники неспецифічної резистентності: фагоцитарну активність (ФА) по В.Е. Чумаченко, бактерицидну активність сироватки крові (БАСК) по О.В. Смирнової та Кузміною, лізоцимну активність сироватки

крові (ЛАСК) по Маркову Ю.М. та ін. Піддослідні тварини, які одержували препарат «Евіталія», мали гарний апетит, були рухливі.

Результати та їх обговорення

Мікроклімат, де утримувались піддослідні козенята характеризувався наступними показниками: температура повітря була в межах 12–14 °С, відносна вологість 55–70%, вміст діоксиду вуглецю – 1,5–1,8 л/м³, аміаку – 10–15 мг/м³, обмінені повітря мікроорганізмами 15–20 тис. КУО/м³. В цілому параметри мікроклімату відповідали нормативам ВНТП АПК – 03.05 для вівчарських та козівничих підприємств.

Гематологічні показники об'єктивно відображують клінічний статус та стан здоров'я козенят (таблиця 1)

Таблиця 1

Морфологічний склад крові козенят (M±m, n=5)

Групи тварин	Еритроцити Т/л	Лейкоцити Г/л	Гемоглобін г/л
На початку дослідження			
Контрольна	10,20 ± 0,13	10,20 ± 0,22	116,30 ± 0,68
Дослідна	10,20 ± 0,19	10,30 ± 0,16	116,30 ± 0,53
У кінці дослідження			
Контрольна	10,62 ± 0,12	12,00 ± 0,16	116,06 ± 0,29
Дослідна	11,70 ± 0,27**	11,13 ± 0,21**	116,95 ± 0,26*

Примітка *P ≤ 0,05 **P ≤ 0,01, ***P ≤ 0,001

Слід відмітити, що найкращі показники спостерігалися в дослідній групі при годуванні «Евіталія». Так кількість еритроцитів в цій групі була більша ніж в контрольній групі на 10,2%, відповідно. В той же час кількість лейкоцитів в цій групі була на 6,9% менше, ніж в контрольній. Таким чином, наведені в табл. 1 дані свідчать про те, що в стресовий період

морфологічні показники крові погіршуються, а використання закваски «Евіталія» покращує її морфологічний склад, збільшує кількість еритроцитів та концентрацію гемоглобіну, що забезпечує кращу оксигенацію та біосинтетичні процеси в тканинах організму.

Одним з показників природної резистентності організму є білковий спектр сироватки крові (табл. 2).

Таблиця 2

Вміст загального білку та білкових фракцій в сироватці крові (M ± m, n = 5)

Групи	Загальний білок, г/л	Альбуміни, %	Глобуліни, %		
			α	β	γ
На початку досліджу					
Контрольна	67,02 ± 0,09	48,82 ± 0,15	13,20 ± 0,19	12,00 ± 0,16	26,00 ± 0,11
Дослідна	63,02 ± 0,11	48,56 ± 0,14	12,40 ± 0,20	13,56 ± 0,14	25,50 ± 0,17
У кінці досліджу					
Контрольна	67,02 ± 0,09	48,82 ± 0,15	13,20 ± 0,19	12,00 ± 0,16	26,00 ± 0,11
Дослідна	67,52 ± 0,17	49,48 ± 0,10*	14,90 ± 0,16**	8,75 ± 0,12***	26,90 ± 0,13**

Примітка *P ≤ 0,05 **P ≤ 0,01, ***P ≤ 0,001

Як свідчать дані табл. 2 на початку дослідження показники загального білку і його фракцій в сироватці крові у всіх групах були приблизно однакові. Спостерігається помітне зростання вмісту білкових фракцій, альбумінів та гамма-глобулінів, які характеризують гуморальний захист організму. Так при годуванні «Евіталія», кількість альбумінів перевищує контроль на 1,4%, а гамма-глобулінів – відповідно 3,5%. Але всі показники білкових фракцій сироватки крові ягнят та співвідношення між альбуміновими і глобуліновими фракціями знаходяться в межах допустимих норм.

Таким чином, зростання питомої ваги гамма-глобулінів (імуноглобулінів) в глобуліновій фракції, які забезпечують гуморальний захист організму, при використанні препарату «Евіталія» свідчить, про підвищення природної резистентності тварин, характеризує морфологічну зрілість і функціональну повноцінність імунореактивної системи.

Стан неспецифічної резистентності організму забезпечується клітинними та гуморальними показниками крові (табл. 3).

Таблиця 3

Показники неспецифічної резистентності козенят при згодовуванні закваски «Евіталія». (М±m, n=5)

Групи тварин	ФА, %	БАСК, %	ЛАСК, %
На початку досліджу			
Контрольна	32,52 ± 0,14	76,32 ± 0,20	29,82 ± 0,12
Дослідна	32,50 ± 0,16	76,38 ± 0,12	29,86 ± 0,17
У кінці досліджу			
Контрольна	31,38 ± 0,07	76,90 ± 0,11	28,76 ± 0,10
Дослідна	32,94 ± 0,09***	77,54 ± 0,12*	30,40 ± 0,10***

Примітка * $P \leq 0,05$ ** $P \leq 0,01$, *** $P \leq 0,001$

Дані таблиці 3 свідчать про те, що показники, які характеризують природну резистентність організму, знижують фагоцитарної активності на – 4,97%, лізоцимної – на 5,70%, бактерицидна активності сироватки крові навпаки підвищується на 0,83% порівняно з контрольною групою ($P < 0,05$). Дослідження свідчать про позитивний вплив препарату «Евіталія» на підвищення природної резистентності організму та зменшення впливу стресового фактору на козенят.

Висновки

Використання препарату «Евіталія» має стимулюючий вплив на показники неспецифічної природної резистентності організму козенят, підвищує БАСК і ЛАСК та знижує дію стрес-факторів.

Бібліографічні посилання

- Bokun, A.A. Derevjanko, S.V., Djachenko, G.M. (2002). *Primenenie probiotikov v zhivotnovodstve. Veterinarnaja medicina.* 80, 94–97 (in Ukrainian).
 Derevjanko, S.V., Djachenko, T.M., Bozhok, L.V. (2004). *Probiotychni preparaty dlja profilaktyky i likuvannja*

- hvorob ta stymuljacii' rostu sil's'ko-gospodars'kyh tvaryn i ptyci. Veterynarna medycyna.* 84, 819–823 (in Ukrainian).
 Kosenko, M.V., Malyk, O.G., Kosenko, Ju.M. (2004). *Problemy ekologii'. L'viv: Dobra sprava.* 273–368 (in Ukrainian).
 Panin, A.N., Malik, N.I., Ilaev, O.S. (2012). *Probiotiki v zhivotnovodstve – sostojanie i perspektivy. Veterinarija.* 3, 3–8 (in Ukrainian).
 Trubnikov, P.V. (2007). *Korreljacija immunologicheskikh i gematologicheskikh pokazatelej krovi koz. «Sostojanie, perspektivy, strategija razvitija i nauchnogo obespechenija ovcevodstva i kozovodstva RF»: mezhd. nauch.–prakt. konf. Stavropol'. GNU SNIIZhK.* 3, 34–37 (in Russian).
 Chornyj, M.V., Petrenko, A.M., Kushh, L.L., Logachova L.O. (2016). *Vykorystannja Mobes i vitaminu V12 pry vyroshhuvanni kozenjat v umovah neregul'ovanogo mikroklimatu. Nauk. visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologii' im. S.Z. Gzhyc'kogo.* L'viv. 18, 1(65), 2, 196–202 (in Ukrainian).

Стаття надійшла до редакції 1.10.2016